

犬糸状虫症予防・消化管内線虫駆除剤

貯法
室温保存

動物用医薬品  
要指示医薬品：注意-獣医師等の処方せん・指示により使用すること

日本標準商品分類番号
879759

T05

**ミルベマイシンA錠 1.25**  
**ミルベマイシンA錠 2.5**  
**ミルベマイシンA錠 5**  
**ミルベマイシンA錠 10**

MILBEMYCIN A TABLETS


ミルベマイシン オキシム製剤

本剤は三共が開発したミルベマイシン オキシムの経口投与用錠剤です。ミルベマイシン オキシムはStreptomyces hygroscopicus subsp. aureolacrimosusの産生する16員環ラクトン構造を有するミルベマイシンA<sub>4</sub>およびA<sub>3</sub>の化学的誘導体であります。本剤は1ヵ月1回の経口投与で犬糸状虫症を予防し、且つ、犬消化管内線虫に対しても強い駆虫作用を有する薬剤です。

【組成・性状】

- ミルベマイシンA錠1.25：  
1錠中にミルベマイシン オキシムを1.25mg含有する片面に割線の入った淡黄色の素錠
- ミルベマイシンA錠2.5：  
1錠中にミルベマイシン オキシムを2.5mg含有する片面に割線の入った淡黄色の素錠
- ミルベマイシンA錠5：  
1錠中にミルベマイシン オキシムを5mg含有する片面に割線の入った淡黄色の素錠
- ミルベマイシンA錠10：  
1錠中にミルベマイシン オキシムを10mg含有する片面に割線の入った淡黄色の素錠

ミルベマイシン オキシムは次の化学構造式で示される白色～帯黄白色の粉末で、においはないか、又はわずかに特異なおいがある。本化合物はアセトニトリル、メタノール、エタノール(99.5)、酢酸エチル又はジエチルエーテルに極めて溶けやすく、水にはほとんど溶けない。



【効能又は効果】

- 犬：犬糸状虫症の予防  
犬回虫及び犬鉤虫の駆除  
犬鞭虫の駆除

【用法及び用量】

- 犬糸状虫症の予防  
ミルベマイシンA錠1.25：  
犬の体重2.5～5kgあたり、1錠を毎月1回、1ヵ月間隔で経口投与する。投与期間は、蚊の発生から蚊の発生終息1ヵ月後までの間とする。(ミルベマイシン オキシムとして体重1kg当たり0.25～0.5mg)

- ミルベマイシンA錠2.5：  
犬の体重5～10kgあたり、1錠を毎月1回、1ヵ月間隔で経口投与する。投与期間は、蚊の発生から蚊の発生終息1ヵ月後までの間とする。(ミルベマイシン オキシムとして体重1kg当たり0.25～0.5mg)
- ミルベマイシンA錠5：  
犬の体重10～20kgあたり、1錠を毎月1回、1ヵ月間隔で経口投与する。投与期間は、蚊の発生から蚊の発生終息1ヵ月後までの間とする。(ミルベマイシン オキシムとして体重1kg当たり0.25～0.5mg)
- ミルベマイシンA錠10：  
犬の体重20～40kgあたり、1錠を毎月1回、1ヵ月間隔で経口投与する。投与期間は、蚊の発生から蚊の発生終息1ヵ月後までの間とする。(ミルベマイシン オキシムとして体重1kg当たり0.25～0.5mg)

犬回虫及び犬鉤虫の駆除

- ミルベマイシンA錠1.25：  
犬の体重2.5～5kgあたり、1錠を1回経口投与する。(ミルベマイシン オキシムとして体重1kg当たり0.25～0.5mg)
- ミルベマイシンA錠2.5：  
犬の体重5～10kgあたり、1錠を1回経口投与する。(ミルベマイシン オキシムとして体重1kg当たり0.25～0.5mg)
- ミルベマイシンA錠5：  
犬の体重10～20kgあたり、1錠を1回経口投与する。(ミルベマイシン オキシムとして体重1kg当たり0.25～0.5mg)
- ミルベマイシンA錠10：  
犬の体重20～40kgあたり、1錠を1回経口投与する。(ミルベマイシン オキシムとして体重1kg当たり0.25～0.5mg)

犬鞭虫の駆除

- ミルベマイシンA錠1.25：  
犬の体重1.25～2.5kgあたり、1錠を1回経口投与する。(ミルベマイシン オキシムとして体重1kg当たり0.5～1.0mg)
- ミルベマイシンA錠2.5：  
犬の体重2.5～5kgあたり、1錠を1回経口投与する。(ミルベマイシン オキシムとして体重1kg当たり0.5～1.0mg)
- ミルベマイシンA錠5：  
犬の体重5～10kgあたり、1錠を1回経口投与する。(ミルベマイシン オキシムとして体重1kg当たり0.5～1.0mg)

ルベマイシン オキシムとして体重1kg当たり0.5－1.0mg)  
ミルベマイシンA錠10：  
犬の体重10－20kgあたり、1錠を1回経口投与する。(ミルベマイシン オキシムとして体重1kg当たり0.5－1.0mg)

**【使用上の注意】**

\*\*\*[一般的注意]

- (1)本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方せん・指示により使用すること。
- (2)本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- (3)本剤は定められた用法・用量を厳守すること。

\*\*\*[使用者に対する注意]

誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。

\*\*\*[犬に対する注意]

1 制限事項

- (1)本剤の投与前には健康状態について検査し、使用の可否を決めること。
- (2)本剤投与前に必ず血液検査を行い、ミクロフィラリアがないことを確認した後、投薬を行うこと。
- (3)犬糸状虫感染犬に本剤を投与する場合は、成虫およびミクロフィラリアを駆除するなど適切な処置を行い、投薬を行うこと。
- (4)ミルベマイシンオキシムの試験において、コリー犬及びその系統の犬種は他の犬種に比べ、安全域が狭いことが示されていることから、これらの犬種に対しては、用法・用量を厳密に守ること。

2 副作用

- (1)副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。
- (2)投与犬において、ときに、下痢、軟便が認められることがある。
- (3)犬糸状虫感染犬に投与した場合、元気消失、食欲不振、嘔吐、呼吸速迫、大静脈症候群等の症状が現れることがある。

\*\*\*[取扱い上の注意]

使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。

\*\*\*[保管上の注意]

- (1)本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
- (2)小児の手の届かないところに保管すること。
- (3)誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。

\*\*\*【包装】

ミルベマイシンA錠1.25	36錠(PTP)	120錠(PTP)
ミルベマイシンA錠2.5	36錠(PTP)	120錠(PTP)
ミルベマイシンA錠5	36錠(PTP)	120錠(PTP)
ミルベマイシンA錠10	36錠(PTP)	120錠(PTP)

本剤以外には次の顆粒剤があります。

ミルベマイシンA顆粒  
ミルベマイシンA顆粒10

※製造販売業者

**ノバルティス アニマルヘルス株式会社**  
東京都港区西麻布4丁目12番24号

ノバルティスカスタマーサービス TEL 0120-162-419  
月～金 9:00～12:00, 13:00～17:00(祝祭日除く)